



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

مرکز آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

داروی ریسپریدون برای بیماران و همراهان

شناسنامه آموزش به پرسنل-بیماران و همراهان

عنوان: داروی ریسپریدون برای بیماران و

همراهان

تایید کننده: دکتر احد فاضلی (روانپزشک)

تهیه کننده: خدیجه فرضی (سوپروایزر آموزش سلامت)

تدوین: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ بازنگری دوم: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شماره تماس واحد پرستار پیگیر: ۰۶۶۳۳۴۱۵۲۶۵

شماره کانال جهت آموزش مجازی واحد پرستار

پیگیر: ۰۹۳۰۳۳۲۸۶۳۱

شماره تماس واحد مددکاری-تغذیه جهت

مشاوره: ۰۶۶۳۳۴۱۳۰۸۵-۰۶۶۳۳۴۱۳۰۷۸

(داخلی ۱۳۳)

سایت بیمارستان جهت دسترسی به کلیه مطالب

آموزشی (کتابچه - پمفلت -

پوستر ... www.nerves.lums.ir)

آدرس: درمانگاه صدیق: خرم آباد، ابتدای سه راه

بالای مطهری، کلینیک خیریه صدیق شماره تماس:

۰۶۶۳۳۴۲۴۳۰ ساعت نوبت دهی: ۱۰-۸

درمانگاه ترک اعتیاد (MMT): خرم آباد، کوی

اندیشه، خیابان اندیشه ۱۳ (جهت تهیه شربت

متادون، شربت تننور، قرص B2)

سلامت و نشاط جسمی و روحی شما هدف و آرزوی ماست



Risperidone

ریسپریدون

منابع:

(۱) وزارت بهداشت. معاونت غذایی و دارویی- دارونامه

رسمی ایران

(۲) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران- دکتر

رامین خدام.

آدرس: خرم آباد - کمالوند- روبروی کهریز- مجتمع

پردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان- بیمارستان

آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

تلفن: ۰۶۶۳۳۴۱۳۰۸۳-۸۵

ریسپریدون

جز داروهای روانپزشکی می باشد برای اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی و اوتیسم در کودکان ۱۷-۵ سال، اختلالات اضطرابی و حرکتی نیز استفاده می شود.

توجه داشته باشید که دارو را نباید خودسرانه و پیش از زمان تعیین شده قطع کنید این دارو در کوتاه کردن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی مؤثر است.

اشکال دارویی:

به شکل قرص های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ میلی گرم موجود می باشد.

عوارض جانبی:

سر درد- خواب آلودگی- سرگیجه، احساس سنگینی سر ، مشکل در تمرکز، بی قراری، اضطراب، تحریک پذیری، خشکی دهان، ناراحتی گوارشی مانند (یبوست، اسهال، سوزش سردل)، افزایش وزن، خونریزی قاعدگی، مشکل در دفع ادرار، افزایش ترشح بزاق بخصوص آبریزش از دهان در زمان خواب از عوارض دارویی می باشند در صورت بروز عوارض به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخل دارویی:

لطفاً توجه نمایید که در صورت استفاده داروهای مانند کاربامازپین، فنی توئین، فنوبارپیتال، فلوکستین، ریفامپین، و داروهای بیماری پارکینسون مانند لوودوپا قبل از استفاده از ریسپریدون به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

- مصرف همزمان ریسپریدون با داروهای ضد افسردگی آنتی هیستامین ها، آرام بخش ها و ضد دردهای حاوی مخدر باعث افزایش اثرات این دارو می شود.

- در صورت ابتلا به بیماری دیابت و یا داشتن سابقه خانوادگی دیابت و مشکلات کبدی و کلیوی پزشک معالج خود را مطلع کنید.

- مصرف همزمان ریسپریدون با داروهای کاهنده فشار خون باعث تشدید خاصیت کاهندگی دارو می شود. کاهنده فشار خون می شود.

نکات قابل توجه یا آموزش به بیمار:

- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی نزدیک است نوبت فراموش شده را نخورید و هرگز میزان دارو را خودسرانه افزایش یا کاهش ندهید و از قطع خودسرانه دارو بپرهیزید.

- قرص را بطور کامل بخورید و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری کنید.

- داروها را در دمای معمولی اتاق دور از رطوبت، نور مستقیم و حرارت زیاد نگه داری کنید.

الکل حالت خواب آلودگی و گیجی این دارو را تشدید می کند لذا از نوشیدن الکل بپرهیزید.

- در صورت بروز ناگهانی افزایش درجه حرارت بدن، تغییر وضعیت هوشیاری، تعریق بیش از حد، افزایش یا کاهش ناگهانی فشار خون سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- دارو را می توانید به همراه غذا یا به صورت ناشتا بخورید.

- در صورتیکه قصد بارداری دارید و یا دوران شیردهی را طی می کنید با پزشک خود مشورت کنید.

- برای بهبود نشانه های بیماری حداقل چند هفته باید مصرف دارو را ادامه دهید و برای کسب نتایج درمانی مطلوب دارو را مطابق دستور تجویز شده مصرف کنید.

- ریسپریدون ممکن است باعث ایجاد احساس سرگیجه شود مخصوصاً در زمان بلند شدن ناگهانی یا هر گونه تغییر حالت ناگهانی جهت جلوگیری از سقوط به آرامی تغییر حالت دهید از وضعیت خوابیده به حالت نشسته سپس از حالت نشسته به ایستاده