



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

مرکز آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

دانستنی های داروی سدیم والپروات

برای بیماران و همراهان

شناسنامه آموزش به پرسنل-بیماران و همراهان

عنوان: دانستنی های داروی سدیم والپروات

برای بیماران و همراهان

تایید کننده: دکتر احد فاضلی (روانپزشک)

تهیه کننده: خدیجه فرضی (سوپروایزر آموزش سلامت)

تدوین: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ بازنگری دوم: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



منابع: (۱) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران-

دکتر رامین خدام

شماره تماس واحد پرستار پیگیر: ۰۶۶۳۳۴۱۵۲۶۵

شماره کانال جهت آموزش مجازی واحد پرستار

پیگیر: ۰۹۳۰۳۳۲۸۶۳۱

شماره تماس واحد مددکاری-تغذیه جهت مشاوره: ۰۶۶۳۳۴۱۳۰۸۵-

۰۶۶۳۳۴۱۳۰۷۸ (داخلی ۱۳۳)

سایت بیمارستان جهت دسترسی به کلیه مطالب آموزشی (کتابچه -

پمفلت- پوستر ... www.nerves.lums.ir)

آدرس: درمانگاه صدیق: خرم آباد، ابتدای سه راه بالای مطهری،

کلینیک خیریه صدیق شماره تماس: ۰۶۶۳۳۲۴۲۴۳۰ ساعت

نوبت دهی: ۸-۱۰

درمانگاه ترک اعتیاد (MMT): خرم آباد، کوی اندیشه، خیابان

اندیشه ۱۳ (جهت تهیه شربت متادون، شربت تننتور، قرص B2)

سلامت و نشاط جسمی و روحی شما هدف و آرزوی ماست

- مصرف داروی والپروات سدیم با هپارین و آرفارین و

آسپرین خطر خونریزی را افزایش می دهد.

- مصرف هم زمان داروهای بدون نسخه، ضد دردها و

داروهای گیاهی با سدیم والپروات بایستی به اطلاع

پزشک معالج رسانده شود.

- استفاده دارو با الکل اثر دارو را کم می کند و باعث

کاهش سطح هوشیاری می شود.

- از مصرف همزمان سدیم والپروات با فنی توتین و

فنوباریتال و کلونازپام بدون اطلاع پزشک خودداری

کنید می تواند باعث خواب آلودگی بیش از حد شود.

سدیم والپروات

یک داروی ضد تشنج است و اثرات تثبیت کننده خلق نیز دارد و در درمان اختلال دو قطبی و میگرن نیز کاربرد دارد.

استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی اثر دارد.

نام تجاری:

دپاکین: Depakin- اورلپت Orlept

اشکال دارویی:

قرص ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم و شربت نیز دارد

عوارض جانبی:

عوارض جانبی موقت و نشان دهنده اثر دارو نیز می باشد و بسیاری از عوارض قابل درمان و نیاز به قطع دارو نیست در اولین فرصت با پزشک معالج مشورت کنید.

تهوع و استفراغ، اسهال، سرگیجه و ضعف و تشنگی، یبوست، لرزش دست و افزایش و کاهش اشتها، آسیب کبدی (در صورت درد شکمی و تهوع و بی اشتهایی و زردی پوست) به پزشک اطلاع دهید.

نکات قابل توجه به آموزش به بیمار:

- در طی ۶ ماه اول درمان هر ۲ ماه یکبار آزمایشان کبدی انجام دهید.

- در صورت زردی چشم و پوست و تب و گلو درد خونریزی یا خون مردگی غیر معمول و بارداری در حین مصرف به پزشک خود اطلاع دهید.

- به هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیازمند به هوشیاری دارد احتیاط کنید زیرا امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد.

- در صورت روزه داری با پزشک خود مشورت کنید.

- مصرف دارو را زودتر از موعد مقرر یا بدون نظر پزشک قطع نکنید و هر گونه تغییر در دوز باید با نظر روانپزشک معالج باشد.

- اگر یک نوبت دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن دوز فراموش شده را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده است نوبت فراموش شده را رها کرده به برنامه منظم دارویی خود برگردید و هرگز میزان مصرف بعدی را دو برابر نکنید.

- جهت سنجش سطح خون والپروات سدیم تا ۱۲ ساعت قبل از آزمایش نباید از دارو استفاده شود و بلافاصله بعد از نمونه دارو را مصرف کنید.

- در صورتیکه دچار بیماری جسمی (خونی و کبدی) هستید قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

- برای کاهش مشکلات گوارش قرص ها را بطور کامل بلعیده و آن را همراه غذا مصرف کنید.

- مصرف خوراکی والپروات سدیم با نوشابه های گازدار باعث ایجاد واکنش شده و احساس و طعم نامطبوع و ناخوشایند بدهان داده و گلو را تحریک می کند.

- تا زمانی که دارو را مصرف می کنید از نوشیدن الکل خودداری کنید چون ممکن است باعث افزایش اثر دارو و کاهش سطح هوشیاری شود.

- مصرف هم زمان داروی والپروات سدیم با کاربامازپین باعث کاهش اثر می شود و کنترل تشنج را کاهش دهد.