



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

مرکز آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

دانستنی های داروی کوئتیاپین برای بیماران و همراهان

شناسنامه آموزش به پرسنل-بیماران و همراهان

عنوان: دانستنی های داروی کوئتیاپین برای
بیماران و همراهان

تایید کننده: دکتر احد فاضلی (روانپزشک)

تهیه کننده: خدیجه فرضی (سوپروایزر آموزش سلامت) -

تدوین: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ بازنگری دوم ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



منابع: (۱) کتاب راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران-
دکتر رامین خدام.

(۲) وزارت بهداشت. معاونت غذایی و دارویی- دارونامه رسمی
ایران

شماره تماس واحد پرستار پیگیر: ۰۶۶۳۳۴۱۵۲۶۵

شماره کانال جهت آموزش مجازی واحد پرستار پیگیر: ۰۹۳۰۳۳۲۸۶۳۱

شماره تماس واحد مددکاری-تغذیه جهت مشاوره: ۰۶۶۳۳۴۱۳۰۸۵-
۰۶۶۳۳۴۱۳۰۷۸ (داخلی ۱۳۳)

سایت بیمارستان جهت دسترسی به کلیه مطالب آموزشی (کتابچه - پمفلت -
پوستر ...): www.nerves.lums.ir

آدرس: درمانگاه صدیق: خرم آباد، ابتدای سه راه بالای مطهری، کلینیک
خیریه صدیق شماره تماس: ۰۶۶۳۳۲۴۲۴۳۰ ساعت نوبت دهی: ۱۰-۸

درمانگاه ترک اعتیاد (MMT): خرم آباد، کوی اندیشه، خیابان اندیشه ۱۳
(جهت تهیه شربت متادون، شربت تنتور، قرص B2)

سلامت و نشاط جسمی و روحی شما هدف و آرزوی ماست

- ممکن است با مصرف این دارو افزایش قند خون بروز
کند بیمار مبتلا به دیابت را مرتب کنترل کنید و
بیماران را از نظر علائم هایپرگلیسمی (پر نوشی، پر
ادراری، پر خوری، و ضعف) پایش کنید.

- برای رسیدن به اثر مطلوب درمانی ۲ تا ۶ ماه باید
بگذرد.

- در سالمندان با احتیاط مصرف شود.

- از تغییر وضعیت ناگهانی یعنی بلند شدن سریع از
حالت نشسته یا خوابیده پرهیز کنید چون باعث
سرگیجه می شود.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته پرهیزید و به تاریخ
انقضا داروهای مصرفی خود دقت کنید.

• در دوران بارداری و شیردهی می تواند مشکلاتی در
شیرخواران و نوزادان ایجاد کند.

کوئیتاپین

جزء داروهای روانپزشکی است و برای درمان اسکیزوفرنیا، اختلال دو قطبی به همراه یک داروی ضد افسردگی برای اختلال افسردگی اساسی استفاده می شود.

به آن ترانکوپین و سرکوئل نیز می گویند.

اشکال دارویی:

قرص ۲۵ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرمی وجود دارد.

تداخل دارویی:

- در صورت مصرف هم زمان با داروهای ضد فشار خون باعث ایجاد افت فشار خون می شود.

- در صورت مصرف هر گونه دارو چه با نسخه چه بدون نسخه حتماً در زمان مراجعه به روانپزشکتان اطلاع دهید

- در صورت استفاده با داروهایی مانند سایمتیدین، لورازپام، ریفامپین، آنتی بیوتیکها، فلوکستین، ضد قارچ، ضد ایدز و قرص یا آمپول هالوپریدول، ایمی پرامین، داروهای درمان فشار خون بالا، داروهای مربوط به بیماری های قلبی، داروهای ضد تشنج مانند فنی توفین و فنوباربیتال به پزشکتان اطلاع دهید چون با کوئیتاپین تداخل دارویی دارند.

عوارض دارویی:

بدخواهی، یبوست، کم کاری تیروئید، افزایش وزن، افزایش فشار خون و ضربان قلب، تعریق زیاد، رنگ پریدگی، کهیر، مشکلات تنفسی، اسهال، استفراغ، تهوع، کاهش میل جنسی، کاهش هموگلوبین پرخاشگری، اضطراب، تورم صورت و لبها و زبان و گلو، تغییرات خلق و رفتار، بیش فعالی، افسردگی شدید، سر درد می تواند بدنبال مصرف کوئیتاپین رخ دهد.

اگر عوارض زیادی در نتیجه مصرف دارو برایتان رخ داده است یا از عوارضی که دارید ناراحتید به پزشکتان مراجعه نمایید.

آموزش به بیمار:

- دارو را در مکانی دور از رطوبت و گرما قرار دهید و از دسترس کودکان دور نگه دارید.

- در صورتیکه بیش از یک نوبت دارو خوردن را افزایش کردید به محض یادآوری دارو را میل کنید اما اگر تا نوبت بعدی زمان کمی مانده دوز فراموش شده را نخورید

- دارو را کاملاً طبق دستور پزشک مصرف کنید و هرگز بیشتر از مقدار تجویز شده و مدت تجویز شده مصرف نکنید.

- در صورت بروز درد عضلانی شدید، سفتی ماهیچه ها، تغییرات خلق، حرکات غیر عادی فک و صورت و بدن، تب فوراً به پزشک خود خبر دهید.

- دارو را با لیوانی پر از آب مصرف کنید.

- از له کردن، جویدن و شکستن قرص اجتناب کنید.

- قرص را به صورت کامل ببلعید شکستن قرص ممکن است باعث شود که دارو در همان زمان بسیار زیاد آزاد شود.

- تا ۲ ساعت بعد از مصرف دارو از رانندگی و هر کاری که نیازمند هوشیاری و آگاهی است خودداری کنید.

- از نوشیدن الکل اجتناب کنید چون می تواند عوارض جانبی این دارو را افزایش دهد.

- داروهای سرماخوردگی یا آلرژیک مخدرها، داروهای شل کننده عضلانی، داروهای ضد صرع و اضطراب داروهای خواب آور می توانند اثر خواب آلودگی ناشی از خوردن داروی کوئیتاپین را افزایش دهد.

- در صورت داشتن بیماری قلبی، عروقی، یا عروقی مغزی یا سابقه تشنج به پزشک خود اطلاع دهید.

- بدنبال مصرف کوئیتاپین احتمال تشکیل آب مروارید وجود دارد. بیمار باید قبل شروع درمان و در فواصل ۶ ماهه ضمن مصرف دارو ویزیت چشم پزشکی را انجام دهد.